

①

SOL. PARCIAL DE ANILLOS. 02/03/2016

P, 2º : Apuntes de teoría

3º @ Aplicamos el algoritmo de Euclides:

$$\begin{array}{r} x^4 + 5x^2 + 6 \\ - (x^4 + 2x^2) \\ \hline 3x^2 + 6 \end{array} \quad | \frac{x^3 + 2x}{x}$$

~~$$\begin{array}{r} x^3 + 2x \\ - (x^3 + 2x) \\ \hline 0 \end{array} \quad | \frac{3x^2 + 6}{\frac{1}{3}x}$$~~

Entonces  $3x^2 + 6$  es divisor común (de grado máximo) de  $p$  y  $q$ . Como el m.c.d. se define como un polinomio monómico, lo multiplicamos por  $\frac{1}{3}$

$$\text{mcd}(p, q) = x^2 + 2$$

Id. de Bezout

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 6 = x^4 + 5x^2 + 6 - x \cdot (x^3 + 2x) \\ | \quad x^2 + 2 = \frac{1}{3}(x^4 + 5x^2 + 6) + \left(-\frac{x}{3}\right)(x^3 + 2x) \end{array}$$

② En  $\mathbb{R}[x]$ 

Sabemos que  $p(x)$  tiene  $x^2 + 2$  como factor.

Calculamos el otro:

$$\begin{array}{r} x^4 + 5x^2 + 6 \\ - (x^4 + 2x^2) \\ \hline 3x^2 + 6 \\ - (3x^2 + 6) \\ \hline 0 \end{array} \quad | \frac{x^2 + 2}{x^2 + 3}$$

(2)

dueño  $p(x) = (x^2+2)(x^2+3)$

Estos dos factores son irreducibles ya que son de grado 2 y no tienen raíces en  $\mathbb{R}$ .

Como la factorización tiene coeficientes en  $\mathbb{Z}$ , también es válida en  $\mathbb{Z}_2[x]$  y  $\mathbb{Z}_5[x]$ . Pero hay que estudiar si los factores son irreducibles en  $\mathbb{Z}_2[x]$ :

$$p(x) = (x^2+2)(x^2+3) = x^2 \cdot (x^2+1)$$

$x^2+1$  factoriza como  $(x+1)(x+1)$   
(ya que  $x=1$  es raíz).

$$\text{Por tanto, } p(x) = x^2(x+1)^2 = x \cdot x \cdot (x+1)(x+1)$$

los 4 factores son irreducibles por ser de grado 1.

$$\text{En } \mathbb{Z}_5[x] ; \quad p(x) = (x^2+2)(x^2+3)$$

$f(x) = x^2+2$ . Vemos si tiene raíces:

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \\ f(1) &= 3 \\ f(2) &= 6 = 1 \\ f(3) &= 9+2 = 1 \\ f(4) &= 18 = 3 \end{aligned}$$

Como es de grado 2 sin raíces, es irreducible.

$$g(x) = x^2+3. \quad \text{Si vemos que } g(x) = f(x)+1$$

$$\begin{aligned} \text{tenemos } g(0) &= 3 \\ g(1) &= 4 \\ g(2) &= 2 \\ g(3) &= 2 \\ g(4) &= 4 \end{aligned}$$

Como es de grado 2 sin raíces, es irreducible.

(3)

④ a)  $f: \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$   
 Sí  $([\alpha]_4, [\beta]_3) \mapsto ([\beta]_3, [\alpha]_4)$

es isomorfismo.

b)  NO Dimensiones en  $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$ :  
 Elementos invertibles

Invertibles en  $\mathbb{Z}_3$ : 1, 2

Invertibles en  $\mathbb{Z}_6$ : 1, 5

En  $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$ :  $(1,1), (1,5), (2,1), (2,5)$  (4 elementos)

Invertibles en  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9$ :

en  $\mathbb{Z}_2$ : 1

en  $\mathbb{Z}_9$ : 1, 2, 4, 5, 7, 8

en  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9$ :  $(1,1), (1,2), (1,4), (1,5), (1,7), (1,8)$

(6 elementos)

luego no pueden ser isomorfos por tener  
 distinto número de elementos invertibles.

c)  Sí Como hemos visto en ejercicios, al ser 2 y 9 primos entre sí,

$$f: \mathbb{Z}_{18} \longrightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9$$

$$[\alpha]_{18} \longmapsto ([\alpha]_2, [\alpha]_9)$$

es isomorfismo.

d)  NO  $M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_2)$  no es commutativo;

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq$$

sin embargo  $\mathbb{Z}_{16}$  sí lo es, por lo que no  
 pueden ser isomorfos.

5º  $\mathbb{Z}[x]$  a.c.c.u. por lo que podemos aplicar los teoremas: (4)

$I$  ideal,  $I \neq \mathbb{Z}[x]$

①  $I$  primo  $\Leftrightarrow \mathbb{Z}[x]/I$  D.I.

②  $I$  maximal  $\Leftrightarrow \mathbb{Z}[x]/I$  cuerpo.

③  $I$  maximal  $\Rightarrow I$  primo.

Para  $K = \{ \text{polinomios con término independiente } p \in \mathbb{Z} \}$ ,

como vimos en teoría si  $p, q \notin K \Rightarrow$

$\Rightarrow p, q$  tienen término independiente impar  $\Rightarrow$

$\Rightarrow p - q \in K \Rightarrow [p]_K = [q]_K$ .

luego sólo hay dos clases en  $\mathbb{Z}[x]/K = \{[0]_K, [1]_K\}$

Por tanto  $\mathbb{Z}[x]/K \cong \mathbb{Z}_2$  cuerpo  $\Rightarrow K$  maximal

$\Rightarrow K$  primo.

Para  $I = (x)$  el cociente  $\mathbb{Z}[x]/I$  también está estudiado, vimos  $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$  (usando el 1º tma. de isomorfía).

$\mathbb{Z}$  D.I.  $\Rightarrow (x)$  primo

$\mathbb{Z}$  no es cuerpo  $\Rightarrow (x)$  no es maximal.

Para  $J = (x^2)$  se ve fácilmente que no es primo

$x^2 \in J$ ,  $x^2 = x \cdot x$  y claramente  $x \notin J$

$\Rightarrow J$  no es primo.

Como no es primo  $\Rightarrow J$  no es maximal.

Obs: Otra forma de justificar que  $I, J$  no son maximales es darse cuenta de que  $\mathbb{Z}[x] \subset J \subset I \subset K$ .

(5)

6º  $f: K \rightarrow A$  hom. sup.

$K$  cuerpo

$A$  anillo con unidad.

Sabemos que  $\text{Ker}(f)$  es ideal de  $K$ . Como  $K$  es cuerpo y en un cuerpo sólo el cero y el total son ideales, sólo hay 2 opciones

$$\text{Ker}(f) = K$$

$$\text{o } \text{Ker}(f) = \{0_K\}$$

Descartemos la primera. Es imposible porque si fuera  $\text{Ker}(f) = K$ , tendríamos  $f(a) = 0 \forall a \in K$ . Pero entonces  $f$  no podría ser suprayectiva ya que no existe  $a \in K$  t.q.  $f(a) = 1$  (sabemos que  $A$  tiene unidad).

Por tanto  $\text{Ker}(f) = \{0_K\} \Rightarrow f$  inyectiva  $\Rightarrow$

$\Rightarrow f$  isomorfismo.

sabemos  
 $f$  hom. sup.

