

HOJA DE EJERCICIOS 6
Análisis Matemático.
CURSO 2020–2021.

Problema 1. a) Dada la función $g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida de la siguiente manera:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

demuestra que $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$. Utiliza este resultado para comprobar que la ecuación

$$x^2(e^x - 1) - y^3 = 0,$$

aunque no cumple la condición del teorema de la función implícita en $(x, y) = (0, 0)$, define implícitamente una única función $y(x)$ que es \mathcal{C}^1 para todo $x \in \mathbb{R}$.

b) Demuestra que en la siguiente ecuación:

$$xy + \cos z = 1,$$

no es posible despejar z como función de (x, y) alrededor de $(x_0, y_0) = (0, 0)$ y $z_0 = 0$.

Indicación: Considera x, y muy pequeños y de signos opuestos.

c) Demuestra que la ecuación

$$\cos x - y^3 = 0,$$

define una única función implícita $y(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y dibuja el grafo $\{y = y(x)\}$. Esta $y(x)$ es función \mathcal{C}^∞ de x en un entorno de $x_0 = 0$ (ahí se cumple la condición del teorema de las funciones implícitas), pero encuentra valores de x , alejados del valor 1, en los que $y(x)$ ni siquiera es diferenciable.

Problema 2. Consideramos la función $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida como sigue:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{bmatrix} x_2 \cos x_1 + x_3^2 + 7x_2x_4 \\ e^{x_1}x_3 + 5e^{x_2} - \sin x_3 - x_1x_4^2 \end{bmatrix},$$

y los puntos $a = (0, 1, 0, 0)$, $a' = (0, 0, 0, 1)$ y $a'' = (0, 1, 1, 0)$.

a) Queremos resolver el sistema de dos ecuaciones $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = f(a)$ cerca del punto a . Determina qué dos variables, entre las x_1, x_2, x_3, x_4 , se puede asegurar que se despejan como funciones diferenciables de las otras dos.

b) Misma pregunta para el punto a' .

c) Misma pregunta para el punto a'' .

Problema 3. Si $M, N \subset \mathbb{R}^{n+k}$ son subvariedades n dimensionales arbitrarias, ¿es siempre $M \cup N$ una subvariedad? ¿Y $M \cap N$?

Problema 4. Estudiar si el conjunto

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \neq 0, \pm 1\}$$

es una subvariedad unidimensional de \mathbb{R}^3 . Representar gráficamente M .

Problema 5. Demostrar que $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 = y^2\}$ no es una subvariedad unidimensional de \mathbb{R}^2 .

Problema 6. Representar gráficamente el conjunto

$$C = \{(\cos t, \sin t, t^2(2\pi - t)^2) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq t \leq 2\pi\}$$

y probar que es una subvariedad de dimensión 1 en \mathbb{R}^3 . Hallar los espacios tangente y normal a C en el punto $(1, 0, 0)$.

Problema 7. Considérense las subvariedades de dimensión 1, C_1 y C_2 en \mathbb{R}^3 determinadas, respectivamente, por

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = z^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

a) Representar gráficamente ambas curvas.

b) Probar que, efectivamente, son subvariedades de dimensión 1.

c) Hallar la recta tangente a C_1 en el punto $(1/\sqrt{14}, 2/\sqrt{14}, -3/\sqrt{14})$. Hallar la ecuación del plano normal a C_2 en el punto $((3 + \sqrt{5})/2, (3 + \sqrt{5})/4, -(5 + 3\sqrt{5})/4)$.

d) Calcular parametrizaciones locales de C_1 y de C_2 . *Indicación:* Utilizar coordenadas esféricas en C_1 y cilíndricas en C_2 .

Problema 8. a) Hallar el hiperplano tangente a la gráfica G de la función

$$f(x, y, z) = e^y \cos z + e^z \cos x + e^x \cos y$$

en el punto de G correspondiente a $x = y = z = 0$.

b) Estudiar si

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = 3\}$$

define, localmente en $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$, una superficie regular en \mathbb{R}^3 . Hallar el plano tangente a M en \mathbf{p} . Explicar la relación que guarda éste con el calculado en el apartado anterior.

Problema 9. Sea una parametrización \mathbf{X} de una superficie $S \subset \mathbb{R}^3$ con $\mathbf{X}(0, 0) = (x_0, y_0, z_0)$, y denotemos por $(a_{ij})_{i=1,2,3, j=1,2}$ la matriz de $D\mathbf{X}(0, 0)$. Demostrar que la recta normal a S en (x_0, y_0, z_0) viene dada por

$$\begin{vmatrix} x - x_0 \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y - y_0 \\ a_{31} & a_{11} \\ a_{32} & a_{12} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z - z_0 \\ a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}.$$
