

Hoja 5: Gráficas de funciones y Polinomios de Taylor

1.- Estudiar y representar las gráficas de las siguientes funciones en el conjunto de puntos donde estén definidas.

(a) $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + 2}$ (b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$ (c) $f(x) = |x^2 - 6x + 5| + |x - 2|$

(d) $f(x) = 1 + \frac{16}{2^{\frac{1}{x}} - 4}$ (e) $f(x) = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (f) $f(x) = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

(g) $f(x) = \frac{x^2}{2} - \log|x|$ (h) $f(x) = \log \frac{1+x}{1-x}$ (i) $f(x) = e^{-x^2}$

(j) $f(x) = \begin{cases} |2x + 1| & \text{si } x \leq 1, \\ x^2 - 2x + 4 & \text{si } x > 1. \end{cases}$

2.- Sean f y g dos funciones continuas en a , con $f(a) = g(a)$ y $f'(x) < g'(x)$ en cada punto del intervalo $(a, b]$. Demostrar que $f(x) < g(x)$ para todo $x \in (a, b]$. Deducir de aquí que $\sqrt{x+y} < \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

3.- Considerando la función

$$f(x) = \frac{(1+x)^p}{1+x^p},$$

demostrar que si $a, b > 0$ y $p > 1$ se cumple

$$(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p).$$

4.- Hallar el polinomio de Taylor de grado 4 de las siguientes funciones:

(a) $f(x) = \cos x$ en $a = \frac{\pi}{4}$ (b) $f(x) = \log x$ en $a = 1$ (c) $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$ en $a = 1$

(d) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ en $a = 0$ (e) $f(x) = \frac{1}{1+x}$ en $a = 0$ (f) $f(x) = \arctan x$ en $a = 0$

(g) $f(x) = x^5$ en $a = 3$ (h) $f(x) = \frac{e^x}{1+x^2}$ en $a = 0$ (i) $f(x) = \log(1+x)$ en $a = 0$

(j) $f(x) = 3 + (x-1) + 2(x-1)^2 + 5(x-1)^3$ en $a = 0$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

6.- Probar que para $x > 0$ se cumple

$$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} \leq \sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}.$$

7.- Probar que para $x > 0$ se cumple

$$x - \frac{x^2}{2} < \log(1+x) < x.$$

8.- Probar que para $x > 0$ se cumple

$$1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} \leq 1 - x + \frac{x^2}{2}.$$

9.- Sea f una función 4 veces derivable en un intervalo alrededor del 0. Supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1 + 3x - 5x^2}{x^3} = 0.$$

Calcular $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ y $f'''(0)$.

10.- Usando la función $y = \arctan x$, calcular π con un error menor que 10^{-3} .

11.- Calcular $\cos(1)$ con un error menor que 10^{-3} .

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70